

Balsenes vēzis

Ar balsenes vēzi biežāk slimo vīrieši vecumā no 50- 60 gadiem.

Kas veicina balsenes vēža attīstību?

- smēķēšana;
- pārmērīga alkohola lietošana;
- dažādas izcelsmes balsenes gļotādas iekaisumi;
- termiski, ķīmiski balsenes apdegumi;

Kā izpaužas balsenes vēzis?

Pirmās sūdzības ir balss aizsmakums, svešķermeņa sajūtā rīklē, nelielas sāpes rijot, kā arī var parādīties klepus.

Audzējam progresējot, var pazust balss, nespēja norīt ēdienu, apgrūtināta elpošana.

Vēža ielaistajos gadījumos no mutes jūtama stipra, nepatīkama smaka.

Ielaists, neārstēts vēzis izplatās pa kakla limfmezgliem, kas izpaužas cietu “bumbuļu” veidā uz kakla.

Kā atklāt balsenes vēzi?

Balsenes vēzi agrīni var konstatēt ausu, kakla, deguna ārsts, t.i., LOR. Ārsts balseni apskata ar speciāliem instrumentiem.

Kā ārstēt balsenes vēzi?

Balsenes vēža pamata ārstēšanas metodes ir apstarošana un ķirurģiska ārstēšana, kuras var dažādi variēt. Ārstēšana ir atkarīga no slimības stadijas.