

Taisnās zarnas vēzis

Saslimšanas iespēja ar taisnās zarnas vēzi palielinās pēc 40 gadu vecuma, taču īpaši strauji tā pieaug vecumā no 50 – 80 gadiem. Biežāk slimo vīrieši.

Kā izpaužas taisnās zarnas vēzis?

Šis audzēja veids parasti izpaužas kā asiņošana no taisnās zarnas, šo asiņu tonis ir gaiši sarkans. Slimnieks sūdzas par pilnuma sajūtu taisnajā zarnā un nepabeigta defenācijas akta sajūtu.

Kā atklāt taisnās zarnas vēzi?

Šī vēža atrašanās rajons ir 7-9 cm dziļumā no tūpļa atveres, tāpēc tā konstatēšanai ārsts izmanto rektālo izmeklēšanu, taču galīgai diagnozes noteikšanai rektoskopijas laikā tiek ņemti audu paraugi no audzēja.

Kam ir risks saslimt ar taisnās zarnas vēzi?

Cilvēki, kuri slimojuši ar čūlainu kolītu; Ja ģimenē kāds slimojis ar šo vēzi, kā arī adematoziem polipiem; Ja slimniekam bijis kāds no krūts, olnīcu, dzemdes vēža veidiem; Cilvēkiem, kuriem ģimenē paaudzēs tiek pārmantoti, iedzimti zarnu polipi, ko sauc par ģimenes ademetozo zarnu polipozi.

Kā ārstē taisnās zarnas vēzi?

Šā vēža ārstēšana ir kompleksa. Pirmajā, sākuma stadijā tiek pielietota tikai ķirurģiska ārstēšana. Vēlākajās stadijās papildus ķirurģiskai ārstēšanai pacienti saņem arī ķīmijterapiju un staru terapiju dažādā secībā un kombinācijās.

Informācija par šo slimību atrodama arī mājas lapā: www.onko.lv